

Cervical Cancer Screening Kit Result



You can expect one of three results from your cervical cancer screening kit:

1 Normal Result

A **normal result** means that high-risk human papillomavirus (hrHPV) was not detected. At this time:

- you are at low risk for cervical cancer.
- no further follow-up is needed.

What should I do?

In three years, book a cervical cancer screening test (Pap test) appointment with your healthcare provider or contact CancerCare Manitoba's CervixCheck for help finding a clinic.


2 Abnormal Result

An **abnormal result** means that high-risk HPV was detected. This result does not necessarily mean you have or will get cervical cancer. It means that more treatment is needed to prevent cervical cancer from starting.

CervixCheck will contact you to make an appointment for colposcopy. Be sure to go to the colposcopy appointment.

3 Invalid Result

An **invalid result** means that the presence or absence of high-risk HPV could not be determined from the sample. You will be mailed another cervical cancer screening kit to complete.



What is a colposcopy?

During a colposcopy, the doctor looks at the cervix and vagina using a low-powered magnifier known as a colposcope. If you are pregnant, it is safe to have a colposcopy.

Why is it done?

The doctor uses a colposcope to look for abnormalities on your cervix to determine if a biopsy or treatment is necessary.

What should I do before the colposcopy?

Tell the nurse or doctor if you are allergic to iodine.

What can I expect at colposcopy?

- You will lie down on the exam table and put your feet in supports.
- A speculum is inserted to open the vagina so the cervix can be seen.
- Using a colposcope, the doctor magnifies the cervix. The colposcope stays outside of the body.

What is a biopsy?

During your colposcopy, the doctor may remove a small tissue sample (biopsy) using an instrument similar to a pair of tweezers. The tissue sample is smaller than 1/4 the size of a pencil eraser.

Will a biopsy hurt?

A biopsy takes less than a minute. Some women feel nothing. Others describe a pinching feeling or cramps. This usually stops within a few minutes. Your doctor may suggest a pain reliever.

Does a biopsy have any after-effects?

You may have some bleeding (spotting) for a few days. For at least 24 hours after your biopsy, do **not** put anything into your vagina (e.g. sexual intercourse, tampons, douching).

What types of treatment exist?


Conization

A conization removes a cone shaped piece of tissue. It is done as a day surgery procedure and requires anesthetic. If cancer cells have been found, it will also determine whether these cells have spread to other tissues.




LEEP (Loop Electrosurgical Excision Procedure)

After freezing the area with local anesthetic, an electrical wire loop is inserted into the opening of the cervix and the abnormal tissue is removed.



Laser Surgery

Laser surgery is a treatment that uses an intense, narrow beam of light (called a laser beam) to remove abnormal cervical cells. A local anesthetic is used. Watery discharge is a common side effect and may last up to two weeks.



What will happen after the colposcopy?

The colposcopist will discuss the next steps at the end of your colposcopy appointment. You will likely be asked to attend another colposcopy appointment.

Where can I go if I have more questions or need support?

- CancerCare Manitoba's CervixCheck at:
 - cervixkit.ca
 - screening@cancercare.mb.ca
 - 1-855-95-CHECK (1-855-952-4325, interpreter services are available)
- CancerCare Manitoba Gyne Cancer Patient and Family Educator at 204-787-4229

Résultat de la trousse de dépistage du cancer du col de l'utérus



 CancerCare Manitoba
ActionCancerManitoba

BreastCheck CervixCheck ColonCheck

cervixkit.ca
1 855 95-CHECK

X-BKLT-KIT-RESULT-EF

Vous devriez obtenir l'un des résultats suivants de la trousse de dépistage du cancer du col de l'utérus :

1 Résultat normal

Un résultat **normal** signifie que le VPH à haut risque n'a pas été détecté dans l'échantillon. Pour le moment :

- Vous êtes à faible risque d'être atteinte d'un cancer du col de l'utérus.
- Aucun suivi n'est nécessaire.

Que dois-je faire?

Dans trois ans, prenez rendez-vous pour un test de dépistage du cancer du col de l'utérus (test Pap) auprès de votre fournisseur de soins de santé ou communiquez avec CervixCheck d'Action cancer Manitoba pour de l'aide à trouver une clinique.

2 Résultat anormal

Un résultat **anormal** signifie que le VPH à haut risque a été détecté dans l'échantillon. Ce résultat ne signifie pas nécessairement que vous avez ou aurez un cancer du col de l'utérus. Il signifie qu'un traitement est nécessaire pour prévenir l'apparition du cancer du col de l'utérus.

CervixCheck communiquera avec vous afin de prendre rendez-vous pour une colposcopie. Assurez-vous de vous présenter à ce rendez-vous.

3 Résultat non valide

Un résultat **non valide** signifie que la présence ou l'absence du VPH à haut risque n'a pas pu être déterminée à partir de l'échantillon. Vous recevrez une autre trousse de dépistage du cancer du col de l'utérus par la poste.



Qu'est-ce qu'une colposcopie?

Au cours d'une colposcopie, le médecin examine le col de l'utérus et le vagin à l'aide d'une loupe de faible puissance appelée colposcope. La colposcopie est sans danger pour les femmes enceintes.

Pourquoi est-ce fait?

Le médecin utilise un colposcope pour rechercher des anomalies dans la région du col de l'utérus afin de déterminer si une biopsie ou un traitement est nécessaire.

Que dois-je faire avant une colposcopie?

Si vous êtes allergique à l'iode, dites-le à l'infirmière ou au médecin.

Comment se passe une colposcopie?

- Vous vous allongez sur la table d'examen et placez les pieds dans les étriers.
- Un spéculum est inséré pour ouvrir le vagin et voir le col de l'utérus.
- À l'aide d'un colposcope, le médecin peut voir le col de l'utérus en plus gros. Le colposcope reste à l'extérieur du corps.

Qu'est-ce qu'une biopsie?

Au cours de la colposcopie, le médecin peut prélever un petit échantillon de tissu (biopsie) à l'aide d'un instrument semblable à une pince à épiler. L'échantillon de tissu prélevé est plus petit que le quart de la taille d'une gomme à effacer de crayon.

La biopsie est-elle douloureuse?

Une biopsie prend moins d'une minute. Certaines femmes ne sentent rien. D'autres sentent un pincement ou une crampe. Cela s'arrête généralement en quelques minutes. Votre médecin pourrait vous suggérer un analgésique.

Y a-t-il des effets secondaires?

Vous pourriez avoir des saignements légers pendant quelques jours. Pendant au moins la période des 24 heures suivant la biopsie, n'introduisez **rien** dans votre vagin (p. ex., pas de rapports sexuels, de tampons ou de douches vaginales).

Quels types de traitement existe-t-il?


Conisation

Une conisation à lame froide est le prélèvement d'un tissu de forme conique. C'est une chirurgie de jour qui nécessite une anesthésie. Si l'on a détecté des cellules cancéreuses, cette intervention permettra aussi de déterminer si ces cellules ont atteint d'autres tissus.




LEEP (technique d'excision électrochirurgicale à l'anse)

Après avoir anesthésié localement la zone, le médecin insère une anse électrique dans l'ouverture du col de l'utérus et enlève le tissu anormal.



Chirurgie au laser

La chirurgie au laser est une intervention au cours de laquelle le chirurgien utilise un faisceau lumineux étroit intense (appelé rayon laser) pour enlever les cellules anormales du col de l'utérus. Un anesthésique local est utilisé. Des écoulements de fluide sont un effet secondaire courant qui peut durer jusqu'à deux semaines.



Qu'arrive-t-il après la colposcopie?

Le colposcopiste discutera des prochaines étapes à la fin de votre rendez-vous. On vous demandera probablement de venir à un autre rendez-vous pour une colposcopie.

Où puis-je aller si j'ai plus de questions ou si j'ai besoin de soutien?

- CervixCheck d'Action cancer Manitoba à :
 - cervixkit.ca
 - screening@cancercare.mb.ca
 - 1 855 95-CHECK (1 855 952-4325, des services d'interprétation sont offerts)
- Éducateur d'Action cancer Manitoba pour les familles et les patients de cancer gynécologique : 204 787-4229